

Børneorm (oxyurer) er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis.

Oftest er infektionen symptomløs, men forekommer der symptomer vil de hyppigst bestå af voldsom analkløe.

Af og til er der tillige mavekneb og uro i maven.

Ormen er lille, den ligner en lille hvid sytråd på 1-2 cm's længde. Den voksne orm lever i appendix, colon og rectum. Hunnen vandrer om natten ud i anal- og perinealregionen når æg skal afsættes. Hver hun prosterer 5 - 10.000 æg. "Æglægningen" sker under kraftige bevægelser, hvilket fremkalder en stærk kløe, ofte "lige når man skal sove". Under påfølgende kløe kontamineres hænder og nattøj let. De lagte æg er klæbrige og indeholder en lille larve som ekkes ud i løbet af 3-4 timer.

### PÅVISNING: Analftryk

Æggene kan påvises ved mikroskopi af et aftryk fra anus.

Bedst før morgenvask trykkes en træspatel beklædt med klar tape (limsiden udad) ind mod analåbningen. Æggene vil klæbe sig fast til tapen, der derpå klæbes på et objektglas med den klæbende side mod glasset, således at det område, der har været i berøring med anus placeres på glassets midte. Overskydende tape afrides.

Præparatet mikroskoperes ved 100 gange forstørrelse. Æggene er ovale, 50-60  $\mu$  lange, og indeholder ofte en synlig (evt. levende) larve. Den ene side er rund, den anden side er flad.

